

PREPARACIÓN DE 2 DÍAS PARA LA COLONOSCOPIA (GOLYTELY)



Deberá buscar lo siguiente:

1. La receta nueva del preparado Golytely, o un genérico, de su farmacia
2. Una botella de MiraLax 238 gramos (de venta libre) puede ser genérico
3. Comprimidos de Bisacodyl (Dulcolax) de 10 mg, necesita 6 comprimidos (de venta libre)

Los 7 días anteriores a la intervención, siga una dieta con bajo contenido de fibra y tome MiraLax 17 g a diario.

2 días antes de la intervención:

Solo líquidos transparentes TODO el día

A la mañana, tome MiraLax 17 g (una tapa)

A las 6 p.m., tome 2 comprimidos de Bisacodyl

Un día ANTES de la intervención:

- Beba solo líquidos transparentes TODO el día (consulte el folleto)
- A la mañana, tome MiraLax 17 g (una tapa)
- A la mañana, mezcle su Golytely con agua tibia, bátalo y póngalo en el refrigerador
- La enfermera de admisión lo llamará y le dirá a qué hora debe llegar
- A las 6 p.m., tome los otros 4 comprimidos de Bisacodyl (el horario puede variar)
- A las 6 p.m., beba 3/4 de la preparación recetada de Golytely

El día de la intervención:

- Beba solo líquidos transparentes
- Beba el cuarto restante de la preparación de Golytely 4-5 horas antes de la hora programada de llegada. Incluso si sus heces son claras.
- No beba nada más a partir de 2 horas previas a su llegada